

FIGURES DE BASE DU PLAN



« Le plus court chemin d'un point à un autre est la ligne droite, à condition qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. » *Pierre Dac*¹

I.	Le Point.	2
II.	La Droite.	2
III.	La Demi-droite.	3
IV.	Le Segment.	3
V.	Positions relatives de deux droites.	4
VI.	Positions relatives de trois droites : 3 théorèmes ultra importants.	7
VII.	Pour préparer le test et le contrôle.	6

➤ Matériel : Règle, équerre, crayons de couleur...

➤ Pré-requis pour prendre un bon départ :

	A refaire	A revoir	Maîtrisé
Géométrie élémentaire : points, droites.			
Maniement de la règle.			
Maniement de l'équerre.			
Mesurer une longueur.			
Reporter une longueur au compas.			

¹ **André Isaac** dit **Pierre Dac** (né le 15 août 1893 à Châlons-sur-Marne et mort le 9 février 1975 à Paris) était un humoriste et comédien français. Il reste célèbre pour son sketch *Le Sâr Rabindranath Duval* en 1957 avec le regretté Francis Blanche.

Le but de ce livret est de poser les fondations de la maison « Géométrie », en particulier les droites.

I. LE POINT.

❶ Définition : Le point est le plus petit objet géométrique : il est indivisible, n'a ni « grosseur » ni longueur ni largeur ni poids. Le point est infiniment petit !

❷ Notation : On a l'habitude d'appeler et d'écrire le nom d'un point par une lettre ma.....
Et on représente un point sur une figure par un vrai point comme celui ci : • !

➤ Figure : Placer ci dessous deux points *distincts* (c'est à dire *séparés ou non confondus*) A et B.

II. LA DROITE.

A. Propriété fondamentale de la droite :

Propriété fondamentale : Par deux points *distincts* passe **une unique** droite.

Conséquence : **Deux points sont toujours alignés !**

En reprenant votre figure *au dessus*, tracer la droite passant par les deux points distincts A et B.

➤ **2 remarques importantes :**

❶ Une droite a toujours une longueur

❷ C'est pourquoi sur une feuille, on ne trace jamais des droites, mais seulement **des parties de droites** !

Les "vraies" droites ne peuvent exister que dans notre pensée (je sais, c'est violent comme révélation !).

B. Notation des droites :

Sur votre droite (AB) au dessus, placer deux autres points distincts K et J.

Notation : **Une droite a une infinité** de noms !

Pour cela, on écrit **entre parenthèses** les deux lettres de deux points *distincts* de la droite.

Exemple : La droite passant par deux points distincts A et B se note (AB) ou (BA).

Application : Donner 4 autres noms pour la droite (AB) au dessus :

C. Deux nouveaux symboles : \in et \notin .

Sur la figure au dessus, placez un point M « au hasard ». M est-il forcément aligné avec A et B ?

Placer un point C de telle sorte que C soit aligné avec A et B. Où doit-on le mettre ? Sur

Placer un point D *non aligné* avec A et B. Où doit-on le mettre ?

❶ « Le point C est sur la droite passant par les points A et B » se note :

$C \in (AB)$

On dit aussi que le point C *appartient* à la droite (AB).

❷ « Le point D est en dehors de la droite passant par les points A et B » se note :

$D \notin (AB)$

On dit aussi que le point D *n'appartient pas* à la droite (AB).

III. LA DEMI-DROITE.

Coupez cette droite en deux morceaux :



On obtient 2 morceaux de longueur infinie qui s'appellent des

Définition et notation : La **demi droite notée [AB]** est la partie *infinie* de la droite (AB) qui :

- ❶ qui a pour origine le point A (le crochet) et
- ❷ qui passe par le point B (la parenthèse).

Exemples : (TU] est la demi droite d'origine, passant par




[VW) est la demi droite d'origine, passant par

Représentation : On représente une demi-droite de la manière suivante :



➤ Remarque : Une demi-droite est de **longueur infinie** « du côté de la parenthèse ».

➤ Exercice : Voici une droite et 4 points sur cette droite.



Repasser **en rouge** (un peu au dessus de la droite) la demi-droite [HT].

Repasser **en vert** (un peu en dessous de la droite) la demi-droite (HK).

Les 6 propositions ci-dessous sont-elles vraies ou fausses ?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ La demi-droite [HT] a aussi pour nom [HK]. ❷ La demi-droite [HT] a aussi pour nom (TH). ❸ La demi-droite [GT] passe par K. | <ul style="list-style-type: none"> ❹ La demi droite (TK] passe par G. ❺ $T \in [GH)$. ❻ $K \notin (HT)$. |
|--|---|

Placer sur la figure un point M tel que $M \in (TH)$ mais $M \notin [TH)$.

IV. LE SEGMENT.


Maintenant coupez cette droite en trois morceaux :



On obtient 2 demi-droites et un morceau *fini* qui s'appelle un


Définition et notation :

❶ Le **segment noté [AB] entre crochets** est une partie *finie* de la droite (AB) :
c'est la partie comprise entre les deux points distincts et



❷ Les points A et B sont appelés les **extrémités du segment [AB]**.

➤ Exercice : Repasser **en rouge** le segment [BD].



Voici 6 propositions. Sont-elles vraies ou fausses ?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Le segment [BD] a aussi pour nom [CD]. ❷ Le segment [BD] a aussi pour nom [DB]. ❸ Le segment [AC] passe par C. | <ul style="list-style-type: none"> ❹ $D \in [AD)$. ❺ $B \notin [CB)$. ❻ C est sur [AD]. |
|--|--|

Sur la figure, placez un point M tel que $M \in (AB)$ mais $M \notin [CB)$.

Poursuivons notre voyage dans le monde fascinant de la géométrie. Intéressons nous un peu plus en détail aux droites et à leur positionnement *relatif*, c-à-d la position d'une droite par rapport à une autre. Commençons par 2 droites.

V. POSITIONS RELATIVES DE DEUX DROITES.

Question : Est-il possible que 2 droites aient :

<ul style="list-style-type: none"> • 0 point en commun ? (elles ne se coupent jamais) <p>Faites un croquis pour illustrer ce cas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unique point en commun ? (elles se coupent une unique fois) <p>Faites un croquis pour illustrer ce cas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • seulement 2 points en commun ? (elles se couperaient 2 fois uniquement) • Une infinité de points communs ? Faites un croquis pour illustrer ce cas.
--	---	--

En fait, il n'y a que 3 cas possibles pour la position relative de 2 droites.

A. 1^{ère} cas : Droites parallèles.

Définition : Deux droites (d_1) et (d_2) sont dites **parallèles** lorsqu'elles n'ont point commun.

(d_1) et (d_2) ont alors la même direction.

Notation : On note $(d_1) // (d_2)$.

➤ Construction d'une parallèle à une droite :


Sur la figure ci-dessous, une droite (d_1) est déjà tracée en pointillés et un point M est déjà placé.

On veut tracer une droite (d_2) qui sera parallèle à (d_1) et qui passera par le point M.

Méthode en étapes :



- ① On pose un côté droit de l'équerre contre la droite (d_1) .
- ② On place la règle contre le deuxième côté droit de l'équerre, **perpendiculairement** à (d_1) .
- ③ On fait coulisser l'équerre contre la règle parallèlement à (d_1) jusqu'au point M.
- ④ On trace la droite (d_2) grâce à l'équerre.

Sur la figure à droite, reporter les 4 numéros de la méthode.



➤ A vous maintenant :

Sur les 2 figures suivantes, construire **en rouge** (d_3) , la parallèle à (d_2) passant par le point A.



Comment semblent être (d_1) et (d_3) ?

B. 2^{ème} cas : Droites sécantes ; Droites perpendiculaires.

Deux définitions :

- ① On dit que deux droites (d_1) et (d_2) sont **sécantes (ou concourantes)** lorsqu'elles n'ont qu'..... seul point commun (elles se en un unique point).
- ② Cet unique point commun aux deux droites s'appelle le point d'inter..... des deux droites.

➤ Deux figures : Dessinez :

❶ 2 droites (d_1) et (d_2) sécantes en un point A.

❷ 2 droites (d_1) et (d_2) sécantes qui forment à leur intersection 4 angles de même mesure.

Comment sont les deux droites ?

Cas particulier ultra important de deux droites sécantes : deux droites perpendiculaires.

❶ Définition : On dit que deux droites (d_1) et (d_2) sont **perpendiculaires** lorsqu'elles sont sécantes en formant 4 angles de même

❷ Chacun de ces 4 angles de même mesure s'appelle un angle et sa mesure vaut $\frac{360^\circ}{4} = \dots^\circ$.

❸ Notation : « (d_1) et (d_2) sont **perpendiculaires** » se note : $(d_1) \perp (d_2)$

Codage : On code la figure par **un seul petit bout de carré** à l'intersection des 2 droites perpendiculaires.

➤ Figure :


En utilisant votre équerre, tracez **en rouge** (d_1) et (d_2) les **perpendiculaires à la droite (d_3) passant respectivement par B et A.**

Cela veut dire que (d_1) est la perpendiculaire à (d_3) qui passe par B.

et que (d_2) est la perpendiculaire à (d_3) qui passe par A.


N'oubliez pas le codage ! (voir aussi méthode ① livre p. 96)

Comment semblent être (d_1) et (d_2) ?



➤ Exercice : Pour chacun des trois triangles ci dessous, tracez **en rouge la perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point C**. Appelez cette **droite rouge « Δ »** (lettre majuscule du grec ancien qui se lit « Delta », équivalent de la lettre majuscule « D »).

Puis appelez H le point d'intersection entre cette perpendiculaire Δ et la droite (AB).



On verra plus tard que :

La perpendiculaire à la droite (AB) issue du point C s'appelle la « **hauteur issue du sommet C relative au côté [AB]** ».

Cette hauteur matérialise la distance du point C à la droite (AB).

Le point H s'appelle le **ped de la hauteur** issue du sommet C relative au côté [AB]. H est le projeté de C sur (AB).

C. 3^{ème} cas : droites confondues.

Définition : On dit que deux droites sont *confondues* lorsqu'elles ont **tous leurs points en commun**.

Les deux droites forment une seule et même droite !

➤ Exercice : Placez ci dessous 4 points A, B, C et D tels que les droites (AB) et (CD) soient confondues.


D. Exercices récapitulatifs sur les droites :

① Sur le réseau de droites ci-contre, il manque les noms de 4 points.

On sait que :


- (d2) et (EB) sont perpendiculaires en D.
- (BC) et (AE) sont parallèles.

Placer les points C, B, D et E (vérifiez bien !).



② Placer les 7 points A, B, C, D, E, F et G sachant que :

1. A, E et D sont 3 points du cercle \mathcal{C} mais $C \notin \mathcal{C}$.
2. $(AB) \perp (DB)$.
3. (DC) recoupe le cercle en G.
4. (DB) recoupe le cercle en F.
5. $A \in [BC)$.



VI. POSITIONS RELATIVES DE TROIS DROITES : 3 THEOREMES ULTRA IMPORTANTS.

Intéressons nous maintenant au positionnement relatif de 3 droites.

Au crayon, dans chacun des 4 cas, dessinez 3 droites quelconques mais non confondues.

Faites 4 cas différents en raisonnant par rapport au parallélisme (3 droites //, 2 droites //, aucunes //, etc.).

Cas ❶	Cas ❷	Cas ❸	Cas ❹
			•

Normalement, vous avez les 4 cas suivants (corrigez vos figures si besoin) :


	Cas ❶ Les 3 droites ne se coupent pas.	Cas ❷ Parmi les 3 droites, 2 uniquement sont parallèles.	Cas ❸ Aucune droite parallèle. Les 3 droites se coupent 2 à 2.	Cas ❹ Aucune droite parallèle. Les 3 droites se coupent en un même point.
Nombre de points communs	0 pt commun pt commun pt commun pt commun
Nombre de points d'intersection pt d'intersection pts d'intersection pts d'intersection pts d'intersection

Remarque : Vous avez sûrement noté que le cas ❸ est celui des triangles ! Il sera étudié dans le contrat 4.

On va par la suite s'intéresser plus particulièrement aux cas ❶ et ❷.

A. Théorème ① : 2 droites parallèles à une même troisième.

- ① Tracer **en rouge** une droite (d_2) parallèle à (d_1) .
 - ② Tracer **en rouge** une droite (d_3) parallèle aussi à (d_1) .
- Comment semblent être ces deux droites rouges (d_2) et (d_3) ?
-



Théorème ① : Deux droites parallèles à une même troisième.

	(..... conditions ou hypothèses)		(..... résultat ou conclusion)
Quand	$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} (d_2) // (d_1) \\ \textcircled{2} (d_3) // (d_1) \end{array} \right.$	alors	$(d_2) \dots\dots (d_3)$

Autrement dit : Lorsque 2 droites sont parallèles à une même troisième, alors ces deux droites sont parallèles entre elles.

Utilité : Ce théorème (abréviation thm) sert à prouver que deux droites sont

➤ Exercice 1 : ABCD est un parallélogramme.

1. Sur la figure ci contre, tracer en rouge la parallèle à la droite (BC) passant par le point M. Appelez **cette droite rouge** (Δ) (« Delta »).
2. Comment sont les droites (Δ) et (AD) ?

Justifier en utilisant rigoureusement le théorème ① !

-
-



➤ Exercice 2 : ABED et BCGF sont deux rectangles.

Comment sont les droites (AD) et (CG) ?

Justifier en utilisant rigoureusement le théorème ① !

-

Figures




B. Théorème ② : 2 droites perpendiculaires à une même troisième.

① Tracer **en rouge** la perpendiculaire (d_2) à la droite (d_1) passant par A (codage !).

② Tracer **en rouge** la perpendiculaire (d_3) à la droite (d_1) passant par B (codage !).

Comment semblent être ces deux droites rouges (d_2) et (d_3) ?

.....



Théorème ② : Deux droites perpendiculaires à une même troisième.

	(..... conditions ou hypothèses)		(..... résultat ou conclusion)
Quand	$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} (d_2) \perp (d_1) \\ \textcircled{2} (d_3) \perp (d_1) \end{array} \right\}$	alors	$(d_2) \dots\dots (d_3)$

Autrement dit : Lorsque 2 droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors ces deux droites sont forcément parallèles entre elles.

Utilité : Ce théorème sert à montrer que deux droites sont

➤ Exercice 1 :

- Au compas, placer le point C de telle sorte que ABCD soit un carré.
Puis tracer **en rouge** Δ la perpendiculaire à la droite (AB) passant par P.
- Comment sont Δ et (CB) ? Justifier en utilisant le théorème ② !



▪

▪

➤ Exercice 2 : On sait que : $(d_1) \perp (d_3)$; $(d_2) \parallel (d_3) \parallel (d_4)$ et que $(d_5) \perp (d_3)$.


- Certains codages sont a priori faux ! Barrez les en vert !
- Comment sont (d_1) et (d_5) ? Justifier en utilisant le théorème ② !

Figures



C. Théorème ③ : 2 droites parallèles coupées par une perpendiculaire :

- ① Tracer **en rouge** (d_2) la parallèle à (d_1) passant par M.
 - ② Tracer **en rouge** (d_3) la perpendiculaire à (d_1) passant par M (coder en rouge !).
- Comment semblent être ces deux droites rouges (d_2) et (d_3) ?
 (coder en rouge !)



Théorème ③ : Deux droites parallèles coupées par une perpendiculaire.

	(..... conditions ou hypothèses)		(..... résultat ou conclusion)
Quand	$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} (d_2) // (d_1) \\ \textcircled{2} (d_3) \perp (d_1) \end{array} \right.$	alors	$(d_2) \dots\dots (d_3)$

Autrement dit : Lorsque 2 droites sont parallèles entre elles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Utilité : Ce théorème sert à montrer que deux droites sont


➤ Exercice 1 :

1. Au compas, placer le point C de telle sorte que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme.

Tracer **en rouge** Δ la perpendiculaire à la droite (CB) passant par le point P.

- 2. Comment sont les droites Δ et (AD) ? Justifier en utilisant le théorème ③ !
-
-


Figure



➤ Exercice 2 : Reprenons l'exercice 2 page précédente. En utilisant le théorème ③, montrer que :

$(d_2) \perp (d_5)$

$(d_1) \perp (d_4)$



VII. POUR PREPARER LE TEST ET LE CONTROLE.

A. Comment mémoriser les 3 théorèmes sur les droites :

En regardant bien les hypothèses et conclusions de ces 3 théorèmes très importants, on remarque que :

- $\left. \begin{array}{l} // \text{ avec } // \text{ donne } // \\ \perp \text{ avec } \perp \text{ donne } // \end{array} \right\}$ Lorsque les signes sont pareils, on obtient toujours (théorèmes ❶ et ❷).
- $// \text{ avec } \perp \text{ donne } \perp$ Lorsque les signes sont différents, on obtient (théorème ❸).

B. Comment choisir le bon théorème dans un exercice :

Il faut regarder la conclusion des théorèmes !

Si on vous demande de prouver que deux droites sont \perp , on peut utiliser le théorème

Si on vous demande de prouver que deux droites sont $//$, on peut utiliser :

→ le théorème quand on a 3 droites $//$.

→ le théorème quand on a deux perpendiculaires à une même troisième.

C. Je dois savoir :

- Remplissez ce tableau :

	A refaire	A revoir	Maîtrisé
Placer des points sur une figure.			
Utiliser les bonnes notations : droites, segments etc.			
Construire des droites : sécantes, parallèles, perpendiculaires.			
Utiliser le théorème fondamental ❶.			
Utiliser le théorème fondamental ❷.			
Utiliser le théorème fondamental ❸.			
Aimer les figures de base.			

Pour préparer le test et le contrôle : Livre (Magnard 6^{ème} 2006) p.108 et 109.

D. Conseils :

- Théorèmes : Listez les hypothèses données par l'énoncé et/ou le codage.
Utilisez de la couleur.

E. Erreurs classiques :

- Mal lire l'énoncé.
- Théorèmes : Inventer des hypothèses ou du codage qui n'existent pas ou qui nous arrangent !

F. Fiche de révision à faire :

Quelle est la seconde partie de ce contrat double n°2 ?